

兵庫県のり漁場環境情報 (淡路周辺海域 13 号)

2022年 2月15日発行
兵庫のり研究所


栄養塩を消費する珪藻類は、明石海峡部周辺を除き、ほとんど確認されませんでした。窒素は、西浦海域で $1 \mu\text{g-at/L}$ 前後、南浦海域で $1 \sim 2 \mu\text{g-at/L}$ 台、東浦海域で概ね $2 \sim 3 \mu\text{g-at/L}$ 台の値でした。

(珪藻ほか)

栄養塩を消費する珪藻類はほとんど確認されない。明石海峡周辺のみ、キートセロス、スケルトネマがわずかに確認された。

東浦海域では、夜光虫が多く見られ、その影響により栄養塩の値がやや高くなっている。

水温図



		前回値	今回値	平年値	昨年値
東浦地先	窒素	2.3	3.2	2.7	1.9
	リン	0.28	0.35	0.31	0.32
西浦地先	窒素	1.7	0.6	2.6	0.3
	リン	0.32	0.33	0.39	0.30
南浦地先	窒素	2.2	1.5	3.1	1.4
	リン	0.35	0.32	0.38	0.37

(2/4)

(2/15)

栄養塩 (窒素) 図

2022年 2月15日調査

