

# 兵庫県のに漁場環境情報 (淡路周辺海域 9 号)


2023年 1月 5日発行  
 兵庫のに研究所

西浦海域では、明石海峡周辺を除き、小型珪藻のキートセロス、レプトシリンダラスが多く確認されています。東浦海域では、栄養塩を消費する珪藻類は少ない状況です。そのため窒素は、西浦海域で概ね2~3  $\mu\text{g-at/L}$ 台、東浦・南浦海域で3~4  $\mu\text{g-at/L}$ 台の値となっています。

**(珪藻ほか)**

西浦海域の室津浦漁場~南浦海域の阿万漁場では、小型珪藻のキートセロス、レプトシリンダラスが多く確認されており、窒素の値は概ね2~3  $\mu\text{g-at/L}$ 台であった。その他の海域では、キートセロスがわずかに確認される程度と珪藻類の発生量は少なく、窒素の値は概ね4  $\mu\text{g-at/L}$ 台であった。

**水温図**



|      |    | 前回値  | 今回値  | 平年値  | 昨年値  |
|------|----|------|------|------|------|
| 東浦地先 | 窒素 | 4.9  | 4.4  | 5.3  | 4.6  |
|      | リン | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.57 |
| 西浦地先 | 窒素 | 3.7  | 3.1  | 4.9  | 3.2  |
|      | リン | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.55 |
| 南浦地先 | 窒素 | 3.9  | 3.2  | 5.0  | 4.2  |
|      | リン | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.63 |

(12/27)

(1/5)

**栄養塩 (窒素) 図**

2023年 1月 5日調査

