

兵庫県のみ漁場環境情報 (淡路周辺海域 13 号)

2024年 2月16日発行
 兵庫のみ研究所


南浦海域において、小型珪藻のスケルトネマが大量発生しています。西浦海域では、スケルトネマ、キートセロス等が多く確認されています。東浦海域では、依然としてスケルトネマ等は確認されますが、発生量は減少傾向にあります。窒素は、海域全般に $1 \mu\text{g-at/L}$ 以下の値に低下しています。

(珪藻)

南浦海域において、前回(2/7)調査で見られなかった小型珪藻のスケルトネマが、大量発生していた。西浦海域では、スケルトネマ、キートセロス等が依然多く確認されている。東浦海域では、スケルトネマ、レプトシリンダラス等は確認されるが、発生量は大きく減少していた。

また、海域全般に、大型珪藻ユーカンピアがわずかに確認された。

水温図



		前回値	今回値	平年値	昨年値
東浦地先	窒素	2.1	0.4	2.5	2.4
	リン	0.41	0.26	0.31	0.40
西浦地先	窒素	0.6	0.2	2.3	1.7
	リン	0.42	0.35	0.38	0.39
南浦地先	窒素	1.9	0.3	2.7	1.7
	リン	0.44	0.27	0.38	0.41

(2/7)

(2/16)

栄養塩 (窒素) 図

2024年 2月16日調査

