

兵庫県のり漁場環境情報（東播海域 1 号）

2025年10月22日発行
兵庫のり研究所

海域全般に、大型珪藻コシノディスカスがやや多く確認されます。また、加古川以西では同様の珪藻が多く確認され、小型珪藻のスケルトネマやキートセロス等も確認されます。窒素は、上げ潮での調査であったことから、二見漁場以東で概ね4 $\mu\text{g at/L}$ 以上、別府漁場西部で2 $\mu\text{g at/L}$ 台、陸水の影響が見られる海域地先で概ね6 $\mu\text{g at/L}$ 以上の値となっています。

(水温) 漁場内平均23.9℃（平年比1.7℃高く、昨年比0.1℃低い）。(塩分) 平均32.49psu。
(珪藻) 各海域のコシノディスカス発生量（海水1Lあたり）は、加古川以東で100～400細胞、加古川以西で400～600細胞であった。地先漁場では陸水の影響が強く見られ、アンモニア態窒素の値が高くなっていた。

	前回値	今回値	平年値	昨年値
水 温		23.9	22.2	24.0
窒 素		6.7	5.3	5.0
リ ン		0.68	0.59	0.68

(10/24)


西播地先			
伊保 地	水温	24.4℃	伊保 沖 水温 24.3℃
	窒素	2.9	窒素 2.5
	リン	0.61	リン 0.59
白浜 地	水温	24.5℃	白浜 沖 水温 24.3℃
	窒素	4.7	窒素 4.2
	リン	0.68	リン 0.67

2025年10月22日調査

栄養塩（窒素）図

潮：上げ潮

調査時間： 7：23～ 9：41



水温図

